

CARGO E UNIDADE: **Odontólogo**  
(Mossoró)

**Atenção: NÃO ABRA este caderno antes do início da prova.**  
**Tempo total para resolução desta prova: 3 (três) horas.**

**INSTRUÇÕES**

- Assine seu nome, de forma legível, no espaço abaixo indicado e coloque o número correspondente a sua colocação na lista de presença no campo inferior à esquerda. No caso de haver divergência entre nº de ordem e nome do candidato, será considerado para fins de resultado/correção o nome assinado.
- Leia o caderno de prova com tranquilidade e atenção e, em caso de dúvidas, contate o fiscal da prova;
- Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade;
- O caderno deverá conter 20 (vinte) questões objetivas;
- É dada tolerância de 10 (dez) minutos de atraso para entrada na sala. Após esse tempo, não será permitida a entrada de candidatos para execução da prova;
- Para cada uma das questões objetivas são apresentadas **04 (quatro)** alternativas (de “A” a “D”), das quais apenas **1 (uma)** é **correta**;
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais;
- Responda a prova com **caneta esferográfica de tinta preta ou azul**;
- Será **eliminado** do processo seletivo o candidato que, durante a prova, se comunicar com outro candidato, efetuar consultas em livros, aparelhos eletrônicos, aparelhos celulares ou similares; relógios, calculadoras, livros de anotações, impressos, apostilas, internet, entre outros recursos e/ou material de consulta.
- O **Campo de Respostas Oficial** encontra-se abaixo e deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a), colocando a “letra” correspondente à alternativa escolhida. Esse campo servirá como **única** fonte de correção da prova e **não** poderá ser rasurado nem substituído.
- Por política da Instituição, o candidato não poderá levar o caderno de prova ou rascunho, a qualquer momento, podendo levar apenas a folha de **Conferência do Gabarito** para simples acompanhamento/verificação junto ao Gabarito Oficial Preliminar a ser divulgado.
- Aguarde a autorização do fiscal da prova para o seu início.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A) – Utilizar letra de fôrma</b> | <b>DATA</b> |
|--|-------------|

**CAMPO DE RESPOSTAS OFICIAL**

\*Único campo de respostas válido para correção da prova. Deve ser preenchido e entregue no ato da prova.

|                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>QUESTÕES</b>  | <b>01</b> | <b>02</b> | <b>03</b> | <b>04</b> | <b>05</b> | <b>06</b> | <b>07</b> | <b>08</b> | <b>09</b> | <b>10</b> | <b>11</b> | <b>12</b> | <b>13</b> | <b>14</b> | <b>15</b> | <b>16</b> | <b>17</b> | <b>18</b> | <b>19</b> | <b>20</b> |
| <b>RESPOSTAS</b> |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |

1. **(Adaptada METTA- 2012).** Com relação ao diagnóstico da cárie dental, marque a alternativa CORRETA:

- a) A cárie é uma doença de progressão rápida, que destrói os tecidos dentários, devendo o profissional intervir em casos de suspeita de lesão.
- b) Quando da utilização de materiais restauradores adesivos, o preparo cavitário deve limitar-se à lesão cariada, visando uma maior conservação da estrutura dentária.
- c) Uma lesão cariada pode passar de ativa a inativa e permanecer inalterada por longos períodos. Nesses casos, se houver cavitação, pode-se apenas acompanhar o paciente, sem a necessidade de intervenção restauradora.
- d) A radiografia mais utilizada em casos de suspeita de cárie é a periapical, pois permite visualizar a profundidade e a extensão do processo carioso.

2. **(UNC - 2012).** Quando as lesões de cárie progridem e tornam-se cavitadas em dentina, a atividade da lesão determina a variação do aspecto clínico. Sendo assim assinale a alternativa CORRETA:

- a) A lesão inativa apresenta uma dentina amolecida e com coloração escura.
- b) A lesão ativa caracteriza-se por apresentar a dentina amolecida e de coloração amarelada.
- c) A lesão inativa apresenta uma dentina amolecida e com coloração amarelada.
- d) A lesão ativa caracteriza-se por apresentar a dentina amolecida e com coloração escura.

3. **(FAUEL- 2012).** Em relação aos pacientes com *diabetes mellitus* não controlada, o dentista deve estar atento ao possível efeito hiperglicemiante que pode ocorrer após a injeção de uma solução anestésica contendo \_\_\_\_\_.

O vasoconstritor que melhor completa o texto acima é:

- a) Felipressina.
- b) Epinefrina.
- c) Norepinefrina.
- d) Fenilefrina.

4. **(IMAM - 2012).** O metrodinazol é altamente eficaz sobre patógenos gram-negativos anaeróbios. Em odontologia, é mais comumente utilizado em associação com um antibiótico \_\_\_\_\_ para o tratamento de infecções orais agudas graves e periodontite agressiva.

Melhor preenche a lacuna acima a seguinte opção:

- a) ( ) B-Lactâmicos.

- b) ( ) Macrolídeo.
- c) ( ) Lincosamídicos.
- d) ( ) Aminoglicosídeos.

**5. (FADESP- 2013).** Um paciente precisa submeter-se à cirurgia odontológica, mas, na anamnese, ele relata que apresenta problemas na válvula cardíaca e alergia à penicilina. Dentre os antibióticos abaixo, aquele que pode ser usado na profilaxia da endocardite bacteriana para pacientes alérgicos à penicilina é:

- a) Benzetacil 2.400.000 ui. – 01 hora antes.
- b) Ampicilina 2g V.O. – 30 minutos antes.
- c) Clindamicina 600mg V.O. – 01 hora antes.
- d) Benzetacil 1.200.000 ui. I.M. – 30 minutos antes.

**6. (Adaptada METTA - 2012).** Com relação à fluorose dental é CORRETO afirmar:

- I. A fluorose consiste em um distúrbio induzido pelo fluoreto durante a formação do dente, que resulta em hipomineralização do esmalte, em especial da sua subsuperfície, aumentando a porosidade ao longo das estrias de Retzius e gerando opacidade.
- II. É causada pela ingestão excessiva de fluoreto durante o período de irrupção dentária, ou seja, até por volta dos 16 anos.
- III. Pode ser observada por diversos tipos de comprometimentos estruturais e estéticos, dependendo do seu grau de envolvimento.
- IV. O diagnóstico diferencial com outras patologias é possível desde que se realize uma boa anamnese e que o profissional tenha o conhecimento das características da fluorose. Podem ser diagnósticos diferenciais da fluorose: a opacidade difusa do esmalte, a hipoplasia do esmalte e a amelogênese imperfeita.

Estão CORRETAS as afirmativas:

- a) I e III;
- b) II e IV;
- c) I, III e IV;
- d) I, II e III;

**7. (Adaptada METTA – 2012).** A sonda exploradora é um instrumento muito utilizado no dia-a-dia do odontólogo. Ela consiste de uma ponta em gancho numa extremidade ou de duas pontas em gancho uma em cada extremidade do instrumento, dependendo do modelo. Em relação ao exame clínico com o uso da sonda exploradora podemos AFIRMAR que:

- a) É o método mais confiável para diagnosticar lesões em superfícies oclusais.
- b) O uso da sonda exploradora não produz efeitos traumáticos no tecido dentário.

- c) É imprescindível para diagnosticar lesões incipientes em sulcos e fissuras.
- d) O uso da sonda exploradora não aumenta a fidelidade do diagnóstico e ainda pode causar iatrogenia.

**8. (IMA - 2012).** Assinale a opção que indica o objetivo para a confecção de bisel em restaurações de resinas compostas:

- a) Expor os prismas de esmalte transversalmente para melhorar o padrão de condicionamento e aprimorar a estética, mascarando a interface entre dente e restauração.
- b) Realizar a extensão preventiva do dente.
- c) Garantir a remoção total de tecido cariado.
- d) Permitir a colocação da maior quantidade possível de resina para aumentar a longevidade da restauração.

**9. (Adaptada SIGNA PROJETOS - 2013).** Em relação aos sistemas adesivos é correto afirmar:

- I. A função da água nos sistemas adesivos autocondicionantes é ionizar os monômeros ácidos para que se tornem aptos a desmineralizar a smear layer e a dentina subjacente para formar a camada híbrida.
- II. O Primer do sistema adesivo de três passos é uma solução hidrofílica compatível com o esmalte e que possui solventes em sua composição.
- III. O Adesivo é a parte hidrofílica do sistema adesivo de três passos e compatível com a resina composta.
- IV. Os sistemas adesivos de dois passos são mais hidrofílicos e tendem a ter maior degradação ao longo do tempo.
- V. O colapso das fibrilas de colágeno é um fenômeno irreversível e aumenta os valores de resistência de união.

Assinale a alternativa correta:

- a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas III e V estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.

**10. (FADESP- 2012).** Um paciente chega ao consultório dentário com dor aguda que irradia para o ouvido. Na anamnese, ele informa que, há três dias, fez exodontia de um dente. Ao exame clínico, observa-se ausência do dente 16, gengiva marginal hiperêmica, alvéolo recoberto com coágulo desorganizado e algumas áreas com osso exposto. O paciente apresenta higiene oral ruim, muita placa bacteriana aderida sobre os dentes, e halitose. Diante desse quadro, a hipótese diagnóstica é de:

- a) Gengivite.
- b) Celulite.
- c) Alveolite.
- d) Pericoronarite.

**11. (REIS AUDITORES – 2012).** Sobre fatores de risco para as doenças periodontais, todas as alternativas estão corretas, exceto:

- a) Os efeitos do tabagismo sobre a função dos neutrófilos têm demonstrado prejuízo da fagocitose e quimiotaxia dessas células quando expostas a grandes níveis da fumaça do tabaco, além do aumento na liberação de produtos oxidativos potencialmente destrutivos, tais como o peróxido de hidrogênio.
- b) O Diabetes mellitus pode resultar no comprometimento da adesão de neutrófilos, quimiotaxia e fagocitose, o que pode facilitar a persistência de bactérias na bolsa periodontal e aumentar significativamente a destruição periodontal.
- c) O estresse emocional pode resultar na desregulação do sistema imune, mediada principalmente pelo eixo hipotálamo-pituitária-adrenal.
- d) A presença de margens de restaurações invadindo o espaço biológico (mais do que 0,5mm subgengival) pode levar à inflamação gengival, formação de bolsa e reabsorção da crista óssea. Entretanto, isto não ocorre quando as margens das restaurações se encontram dentro do sulco gengival sem invasão do espaço biológico.

**12. (FUNDELTA- 2012).** Durante a realização de uma odontosecção por alunos da graduação da Clínica II, um paciente de 23 anos teve suas vias aéreas superiores obstruídas por inalação de alguns fragmentos dentários. De maneira ágil e hábil, o Professor percebeu o sufoco e realizou uma manobra de socorro que salvou o paciente. Como se chama esta manobra?

- a) manobra de Peterson.
- b) manobra de Valsalva.
- c) manobra de Osler.
- d) manobra de Heimlich.

**13. (INSTITUTO CIDADES – 2012 ).** A terapêutica para dentes permanentes anteriores com rizogênese incompleta e necrose é:

- a) Obturação parcial do canal.
- b) Obturação retrograda do canal.
- c) Indução do fechamento do ápice seguida de tratamento de canal.
- d) Exodontia do dente.

**14. (Adaptada METTA - 2012).** Paciente do sexo feminino procura o serviço de Odontologia queixando-se de dor intensa, espontânea e localizada no elemento dentário 25. Também relatou a sensação de o dente estar crescendo. Realizou-se exame clínico, testes pulpares e perirradiculares e exame radiográfico. Os resultados aos testes térmicos de frio e calor foram negativos. Apresentou resposta positiva ao teste de percussão

vertical. A radiografia revelou um aumento na espessura do espaço do ligamento periodontal apical. O diagnóstico do caso apresentado é:

- a) Periodontite apical aguda;
- b) Abscesso perirradicular agudo;
- c) Periodontite apical crônica;
- d) Pulpite irreversível.

**15. (EXATUS - 2012).** Uma resposta dolorosa ao teste térmico da polpa, que permanece depois que o estímulo é removido é característica de:

- a) Polpa normal.
- b) Necrose pulpar.
- c) Pulpite reversível.
- d) Pulpite irreversível.

**16. (INSTITUTO CIDADES - 2012).** Assinale o aspecto que é desfavorável para a indicação de pulpotomia.

- a) Sangramento discreto ou ausente quando acessada.
- b) Sangramento normal após o corte do tecido pulpar.
- c) Polpa dental consistente que oferece certa resistência à ação de uma cureta.
- d) Aspecto da coroa dental quase íntegra.

**17. (Adaptada FUNTEF/PR - 2012).** Lesão branca, comumente encontrada em cavidade bucal e que apresenta potencial de malignização. Área de tecido morfológicamente alterada, que pode apresentar-se como placa ou ser levemente exofítica. Ocorre geralmente em adultos com idade entre 50 e 60 anos, de sexo masculino e normalmente associada ao fumo.

- a) Leucoplasia
- b) Carcinoma de células escamosas oval.
- c) Líquen plano.
- d) Eritroplasia.

**18. (Adaptada METTA - 2012).** A respeito das patologias que acometem as glândulas salivares é CORRETO afirmar:

- I. Mucocele é um pseudocisto que ocorre pela ruptura de um ducto de glândula salivar devido ao trauma, com derramamento de saliva para o interior dos tecidos moles.
- II. Rânula pode ser definida como uma mucocele que ocorre no assoalho bucal e lábios. Apresenta-se clinicamente como uma tumefação azulada ou normocrômica, lateral à linha média.

- III. Sialolitíase pode ser definida como a inflamação da glândula salivar devido à presença de estruturas classificadas no interior do ducto (sialólito). A glândula mais acometida é a sublingual, devido ao trajeto longo e tortuoso do ducto de Warthon associado à secreção mucoide espessa.
- IV. Sialorréia pode ser definida como o excesso de salivação, podendo estar associada a inúmeras causas, como: gravidez, pequenas emoções, erupção dental, menstruação, etc. Na maioria dos casos, não há necessidade de tratamento para a sialorréia.

Estão CORRETAS as alternativas:

- a) I e IV;
- b) I, II e III;
- c) II e III;
- d) II e IV;

**19. (Adaptada UNIUV- 2012).** São características da Síndrome de Sjögren, exceto:

- a) Doença autoimune;
- b) Ocorre principalmente em mulheres de meia-idade;
- c) Ocorre hipersalivação;
- d) Ocorre hipofunção lacrimal;

**20. (MOURA MELO- 2012)** A imagem radiográfica de abscesso crônico é:

- a) Radiopaca e difusa.
- b) Radiopaca com contornos bem definidos.
- c) Radiolúcida e difusa.
- d) Radiolúcida com contornos bem definidos.

## PROCESSO SELETIVO

CARGO E UNIDADE: **Odontólogo**  
**(Mossoró)**

### Atenção Candidato,

- Esse é o anexo de **CONFERÊNCIA DO GABARITO**. Ele não tem validade oficial para o certame, servindo apenas para facilitar seu acompanhamento/verificação do Gabarito Oficial Preliminar do Sesc/RN.
- Para isso, anote abaixo o Gabarito da sua prova, conforme **CAMPO DE RESPOSTAS OFICIAL**.
- Certifique-se de estarem idênticos.
- Confira os documentos que serão divulgados no site oficial do Sesc/RN, no dia agendado para a divulgação do Gabarito Oficial Preliminar e compare seu Gabarito com o Gabarito da Prova realizada.
- Lembre-se que “Se do exame de recursos resultar na anulação de questão(ões), a pontuação correspondente a essa(s) questão(ões) será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. E se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo”.
- Visualize o Quadro de Notas que será divulgado no site e continue acompanhando as demais etapas.
- Boa sorte!

### CAMPO DE RESPOSTAS - CANDIDATO

| QUESTÕES  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| RESPOSTAS |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Este Campo de Respostas tem o intuito **EXCLUSIVO** de facilitar ao candidato o acompanhamento/verificação do Gabarito Oficial Preliminar, não sendo permitida a utilização para qualquer outro fim.

Essa folha poderá ser levada com o candidato